

DĽŽKA ŽIVOTA A PRÍČINY ÚHYNU U PLEMENA RHODESIAN RIDGEBACK

Vyhodnotenie dotazníka SK/CZ Z JÚLA 2020



ZÁKLADNÉ VYHODNOTENIE ZOZBIERANÝCH DÁT

- Dotazník celkovo vyplnilo 214 respondentov, z toho 1 vstup bol vyradený, 7 respondenti neuviedli nijaké informácie o príčine úhynu.
- Hoci dotazník vyplnilo viac respondentov, ako sme očakávali, stále je to na celkové posúdenie populácie RR v Českej republike a na Slovensku málo, takže výsledky treba brať **ORIENTAČNE**. Pre lepšiu predstavu: najviac jedincov (29) z dotazníka sa narodilo v roku 2006. V tomto roku bolo len na Slovensku do plemennej knihy zapísaných 110 RR.
- V grafoch rozlišujeme jedince s PP a bez PP/krížence (krížencov bolo málo), no cieľom nie je porovnávať tieto dve skupiny, skôr aspoň čiastočne odhaliť, čo nesú RR gény všeobecne bez ohľadu na pôvod.



Účel dotazníka

Zber dát o dĺžke života a príčinách úhynu RR.

Cieľová skupina

Majitelia jedincov plemena RR

- s PP
- bez PP
- krížencov RR zo **Slovenska** a **Česka**, ktorým pes uhynul.

Nástroje

Aplikácia Google Forms - dotazník verejne dostupný od 30.6.2020 do 10.7.2020.

Propagácia

FB stránky:

- SKCHR - Slovenský klub chovateľov ridgebackov
- Rodéský ridgeback - celá ČR
- Rodézsky ridgeback - celá SR
- platenej FB reklamy


Dosiahnutý vek

Vzhľadom na to, že získaná vzorka je v porovnaní s celkovou populáciou malá, informácia o priemernom veku by bola zavádzajúca.


Až o 128 jedincoch (60 %) však respondenti uvádzajú, že sa dožili viac ako 10 rokov. Potešujúce je, že 15 jedincov sa dožilo 14 a viac rokov.

Kedže sa RR radí medzi veľké plemená, ako hraničný seniorský vek sme si stanovili **8 rokov**. Aj vo vzorke populácie, s ktorou sme pracovali, počet úhynov výrazne narastol práve v tomto veku.

Vekové rozloženie/pôvod



Vekové rozloženie/pohlavie



Príčiny úhynu

Príčiny úhynu sme rozdelili na:

- náhodné (úraz, nehoda...),
- akútne ochorenia (pes uhynul krátko po stanovení diagnózy),
- chronické ochorenia (pes uhynul po dlhodobej liečbe),
- neznáma príčina,
- iné.

Toto delenie sa ukázalo pre mnohých respondentov ako nezrozumiteľné, resp. ich psy mali viaceré diagnózy, takže sa nedali zaradiť ani do jednej kategórie. V prípadoch, kde majitelia príčinu úhynu rozpísali, sme sa snažili prípad zaradiť ku konkrétnej diagnóze, v niektorých prípadoch je pri jednom jedincovi uvedených viac diagnóz.

Prípadov náhodného úhynu sme zaznamenali 9 (3x úraz, 2x autonehoda, 2x otravy, 1x zlyhanie veterinára, 1x úhyn zdravého jedinca po preventívnom chirurgickom zákroku,

Príčiny úhynu

Príčina	Počet	
	akútne	77
chronické	39	
infekčné	4	
neuvedené	40	
neznáma príčina	36	
náhodný úhyn	10	
nijaké údaje	7	

1x uhynutie v dôsledku smútka za iným psom). Vo veľkej väčšine šlo o psy mladšie ako osem rokov. K náhodným úhynom by sme mohli pridružiť aj infekčné ochorenia, ktoré sa tiež vyskytli u mladých psov a šteniat.

Rakovina

Ako **najčastejšiu príčinu** úhynu uvádzajú respondenti **rakovinu** – 99 prípadov, pričom sa aj pri neznámej príčine úhynu vo vyššom veku dá predpokladať, že úhyn, resp. zhoršenie zdravotného stavu mohlo spôsobiť nádorové ochorenie., čiže v našej vzorke bude rakovina príčinou úhynu zrejme vo viac ako 50 %.


V 16 prípadoch respondenti nádor nešpecifikovali. Zo zozbieraných prípadov rakoviny šlo v 18 % o jedince

mladšie ako 8 rokov, najčastejšie sa objavili: **rakovina kosti** – 3x, **lymfóm** – 3x a **rakovina mozgu** 2x.


V kategórii 8 rokov a viac rovnako vedie **rakovina kosti** – 12x, nasleduje **rakovina sleziny** – 9x, pričom v 4 prípadoch mal pes nádor aj na inom orgáne, ďalej **lymfóm** – 6x a zhoubné nádory na **mliečnych žľazach** – 7x.

V troch prípadoch sa objavili nádory na vaječníkoch, čo je u psov menej rozšírený druh rakoviny.

Rozloženie rakoviny v skúmanej vzorke



Špecifikácia rakovinových nálezov



Ostatné príčiny úhynu

Z ostatných príčin úhynu, resp. ako dôvod uspania zvieraťa respondenti najčastejšie uvádzajú **poruchy pohybového aparátu** (10), **zlyhanie a zlyhávanie obličiek** (10), **torzia žalúdka** (10) a **mŕtvicu** (7).


Poruchy pohybového aparátu vedúce k uspaniu sa vyskytli najmä u psov starších ako 10 rokov (8 z 11). Psi s PP sme zaznamenali 7 (3/4), bez PP/X 3 (2/1). U dvoch ďalších súk s PP bol príčinou uspania syndróm konského chvosta alebo Wobblerov syndróm, obe mali vysoký vek (14 a 12,5 roka).

U 10 psov úhyn súvisel so zlyhaním obličiek, či už akútym, alebo chronickým. Išlo o 4 jedince s PP (0/4) a 6 jedincov bez PP (4/2). Všetky jedince mali viac ako 10 rokov.

Torzia žalúdka postihla 10 jedincov, s PP 4 (2/3), bez PP (5/1). Len dva jedince boli mladšie ako 8 rokov (6 rokov a 7,5 roka).

Mŕtvica sa vyskytla u 6 jedincov, s PP 4x (1/3), bez PP 2x (2/0). Všetky zaznamenané jedince mali viac ako 10 rokov.

Prehľad ochorení iných ako rakovina



Okolnosti úhynu

Väčšina jedincov z našej vzorky bola uspaná – viac ako 70 %.

Pri alebo po chirurgickom zákroku uhynulo 9 % jedincov zo vzorky, čo je spolu 19 prípadov. Šesťkrát šlo o torziu (5x žalúdka, 1x sleziny). Ďalej to boli operácie nádorov –

6x, pečene – 1x, pohybového aparátu 1x. V jednom prípade suka uhynula po kastrácii, v jednom prípade pes uhynul na autoimunitnú poruchu po operácii.

POĎAKOVANIE

V PRVOM RADE BY SME SA CHCELI POĎAKOVAŤ VŠETKÝM, ČO DOTAZNÍK VYPLNILI A PODELILI SA O SKÚSENOSŤ, KTORÁ PATRÍ V CHOVE PSOV K TÝM SMUTNEJŠÍM.

ZA SPOLUPRÁCU ĎAKUJEME SLOVENSKÉMU KLUBU RIDGEBACKOV A FACEBOOKOVÝM SKUPINÁM RODÉSKÝ RIDGEBACK - CELÁ ČR A RODÉZSKÝ RIDGEBACK- CELÁ SR, KTORÉ NÁM VÝRAZNE POMOHLI S PROPAGÁCIOU.



© Andrea Černáková a Jana Bagarová, 2020

foto: © Lenka Kollárová